



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง ในจังหวัดสุรินทร์

โดย

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

27 กรกฎาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์

โรคติดต่อนำโดยยุงลาย

เดือน **กรกฎาคม** พ.ศ. 2569



ร่วมกันป้องกัน
กำจัดลูกน้ำยุงลาย
เพื่อชุมชนปลอดภัย ห่างไกลโรค



ประชุมกรรมการ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ด้านสาธารณสุข (กอบ.)

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569

ประเทศไทย

- ▶ จำนวนผู้ป่วย 15,661 ราย
อัตราป่วย 24.00 ต่อแสนประชากร
- ▶ จำนวนผู้เสียชีวิต **20 ราย**
อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.14
- ▶ ภาคที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
คือ ภาคใต้ 55.06
- ▶ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
คือภูเก็ต 229.51

เขต 9 นครราชสีมา

- ▶ จำนวนผู้ป่วย 681 ราย
อัตราป่วย 10.29 ต่อแสนประชากร
- ▶ ไม่มีรายงานเสียชีวิต
- ▶ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
คือ สุรินทร์ (22.62) , นครราชสีมา (7.83),
บุรีรัมย์ (7.35) และชัยภูมิ (4.89)

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569

จังหวัดสุรินทร์

ผู้ป่วย

สะสม **294** ราย

อัตราป่วย 21.66 ต่อแสนประชากร


ผู้เสียชีวิต

สะสม **0** ราย

อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.00

จังหวัดสุรินทร์ อันดับ 1 ของเขต อันดับที่ 31 ของประเทศ

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อแสนประชากร สูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 27.21) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี (ร้อยละ 21.77) และกลุ่มอายุ 15-19 (ร้อยละ 14.63) ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดสุรินทร์

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยปี 2569 กับ จำนวนผู้ป่วยปี 2568 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง


ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569



ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสม พบว่า ปี 2569 มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 182 ราย
น้อยกว่า จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี 2568 และมัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน

แผนภูมิแสดงอัตราป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569



อำเภอที่พบผู้ป่วย

14 จาก 17 อำเภอ

คิดเป็นร้อยละ 82.35%

ตำบลที่พบผู้ป่วย

79 จาก 159 ตำบล

คิดเป็นร้อยละ 49.69%

ตารางแสดงตำบลเข้าเกณฑ์การระบาด โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2569

เมืองสุรินทร์	ปราสาท	ศีขรภูมิ	รัตนบุรี	สังขะ	ลำโรงทับ	ท่าตูม	จอมพระ	ชุมพลบุรี	สนม	กาบเชิง	บัวเชด	เขวาสินรินทร์	โนนนารายณ์	ลำดวน	ศรีณรงค์	พนมดงรัก
ราม	กั๋งแอน	ช่างบี่	หนองบัวบาน	สะกาด	เสมิง	โพนครก	จอมพระ	ชุมพลบุรี	โพนโก	ตะเคียน	ตาวัน	ตาถูก	หนองหลวง	ตระเปียงเตีย	แฉกแวน	โคกกลาง
บุฤาษี	โชคนาสาม	นารุง	ทับใหญ่	ทับทัน	ลำโรงทับ	หนองเมรี	เมืองสิง	นาหนองไผ่	หนองอียอ	ด่าน	บัวเชด	เขวาสินรินทร์	ระเวียง	ลำดวน	หนองแวง	บักได
กาเกาะ	ตานี	ตรมไพร	รัตนบุรี	สังขะ	หนองไผ่ล้อม	ท่าตูม	กระหาด	เมืองบัว	สนม	กาบเชิง	สะเดา	บึง	คำผง	โชคเหนือ	ศรีสุข	จ๊กแดก
เพี้ยราม	กมอ	ตรึม	ธาตุ	ขอนแก่น	กระออม	กระโพ	บุแกรง	กระเบื้อง	หนองระขิง	คูตัน	จรัส	ปราสาททอง	โนน	อุโลก	ณรงค์	ตาเมียง
เจดียง	โคกยาง	ระแงง	แก	ดม	หนองชะ	พรมเทพ	หนองสนิท	ยะวีค	นาหวน	นางมุด	อาโพน	บ้านแร่	หนองเทพ	ตร้ามม	ตรวอ	
เมืองกี	ปรีอ	จารพิต	ดอนแรด	พระแก้ว	ศรีสุข	เมืองแก	บ้านฝือ	ไพรขลา	แคน	โคกตะเคียน	ลำภาลูน					
ในเมือง	ไพล	ยาง	หนองบัวทอง	บ้านจารย์	เกาะแก้ว	บะ	ลุ่มระวี	ศรีณรงค์	หัวจัว							
ตั้งใจ	ทุ่งมน	แตล	ไผ่	กระเทียม	หมื่นศรี	หนองบัว	ชุมแสง	สระขุด								
นาดี	ตาเบา	หนองบัว	เบิด	ตาตูม	สะโน	บัวโคก	เป็นสุข	หนองเรือ								
ท่าสว่าง	หนองใหญ่	คาสะเมะ	น้ำเขียว	ตาคง	ประดู่	ทุ่งกุลา										
สลักได	โคกสะอาด	หนองเหล็ก	กุดขาศิม	บ้านชบ												
ตาอ้อ	บ้านไทร	หนองขาว	ยางสว่าง	เทพรักษา												
ลำโรง	เชื้อเพลิง	กุดหวาย														
แกใหญ่	ปราสาททอง	ขาวใหญ่														
นอกเมือง	บ้านพลวง	พักไหม														
คอโค	กันตวงระมวล															
สวาย	สมุด															
เกนมีย์	ประกิดบุ															
นาบัว																
ตระแสง																
แสงพันร์																

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ ปี 69 ตามเกณฑ์ตำบลระบาด
(ข้อมูลระหว่าง วันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2569)

เกณฑ์ระบาดระดับตำบล	จำนวนตำบล	ร้อยละของตำบลทั้งหมด
ระบาดต่อเนื่อง (ผป. > median และพบ ผป. ต่อเนื่อง > 28 วัน)	9	5.66
ระบาด (ผป. > median)	19	11.95
เสี่ยง (ผป. = median)	12	7.55
ปกติ (ผป. < median หรือไม่มี ผป.)	119	74.84

ที่มา : ซอฟต์แวร์ทันระบาด กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2569

มาตรการและข้อเสนอแนะ โรคติดต่อนำโดยยุงลาย จังหวัดสุรินทร์

4 มาตรการ (ช่วงการระบาด)



1. เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

ความแม่นยำการวิเคราะห์ พท.ระบาด ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วย การเสียชีวิต จุดแข็ง จุดอ่อน กลวิธี



2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชนและสถานที่ 7 ร.

ช่วงก่อนระบาด ช่วงระบาด ความถูกต้อง



3. สอบสวนและควบคุมโรคในผู้ป่วยรายแรกให้ทันเวลาและมีคุณภาพ

3-3-1 จำกัดพื้นที่การระบาด ความต่อเนื่อง



4. เตรียมความพร้อมทรัพยากรการควบคุมโรค การรักษา การส่งต่อ


ลดพท.การระบาด ลดจำนวนผู้ป่วย ไม่ให้มีผู้เสียชีวิต



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

วัคซีนโรค



สถานะเวชโรคจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569:

ค้นพบ ทะลุเป้าหมาย แต่ทำท่ายที่ผลการรักษา

88.97%[↗]

การค้นหาและขึ้นทะเบียน
(TB Treatment Coverage)

✓ 1,742 จากเป้าหมาย 1,958 ราย
(เป้าหมายประเทศ: 85%)

98.03%[↗]

การคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง
(CXR)

✓ 63,902 ราย จากเป้าหมาย
65,184 ราย

73.23%[↘]

ความสำเร็จในการรักษา
(Treatment Success)

ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ 88%
อย่างมีนัยสำคัญ


การค้นหา และขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB treatment coverage)
จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ

เป้าหมาย ร้อยละ 85 ของ 146/แสนประชากร			
อำเภอ	เป้าหมายการค้นหา (คน)	จำนวนการขึ้นทะเบียน (คน)	ร้อยละ
เมืองสุรินทร์	376	688	183.14
ชุมพลบุรี	99	33	33.38
ท่าตูม	133	86	64.90
จอมพระ	82	40	48.52
ปราสาท	216	271	125.48
กาบเชิง	87	36	41.20
รัตนบุรี	130	100	76.95
สนม	62	31	49.87
ศีขรภูมิ	194	116	59.92
สังขะ	187	129	69.14
ลำดวน	42	45	107.08
ลำโรงาบ	76	38	49.77
บัวเชด	53	32	59.97
พนมดงรัก	55	20	36.30
เขวาสินรินทร์	50	26	52.46
ศรีณรงค์	66	27	40.70
โนนนารายณ์	51	24	47.42
รวม	1,958	1,742	88.97

หน่วยงานเขตสุขภาพ / จังหวัด	ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา 2569				ค่าเป้าหมายปี 2569 ความครอบคลุมการ รักษา ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และ	ค่าเป้าหมายปี 2569 ความ ครอบคลุมการ รักษา
	ประชากรกลางปี 68 (1)	146/100000* ประชากรกลางปี 146*(1)/แสน (2)	จำนวนที่ขึ้น ทะเบียน TB07 (3)	ร้อยละความครอบคลุม การรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย ใหม่และกลับเป็นซ้ำ (2/3*100)		
นครราชสีมา	2,478,158	3,618	1,704	47.10	3075	3618
ชัยภูมิ	1,061,615	1,550	844	54.45	1317	1550
บุรีรัมย์	1,520,696	2,220	1,194	53.78	1887	2220
สุรินทร์	1,341,412	1,958	1,742	88.95	1665	1958
เขต 9	6,401,881	9,347	5,484	58.67	7945	9347
ประเทศ	66,023,703	96,395	57,029	59.16	81935	96395
ข้อมูลวันที่ 22 กรกฎาคม 69 ปรับ 146 /100,000 ปชก						

ร้อยละผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB treatment coverage)


จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ




จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) ปึงบประมาณ พ.ศ.2569 (PA) จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด	รักษาสำเร็จ	%	กำลังรักษา	%	ตาย	%	ขาดยา	%	โอนออก	%
เมืองสุรินทร์	142	107	75.35	27	19.01	7	4.93	1	0.70		
ชุมพลบุรี	5	5	100								
ท่าตูม	20	15	75	3	15	2	10				
จอมพระ	7	2	28.57	5	71.43						
ปราสาท	65	52	80			6	9.23	7	10.77		
กาบเชิง	6	5	83.33							1	16.67
รัตนบุรี	17	7	41.18	7	41.18	2	11.76	1	5.88		
สนม	4	4	100								
ศีขรภูมิ	16	11	68.75	4	25	1	6.25				
สังขะ	10	8	80	1	10	1	10				
ลำดวน	8	5	62.50	2	25					1	12.50
สำโรงทาบ	7	7	100								
บัวเชด	5	3	60	1	20	1	20				
พนมดงรัก	3	2	66.67			1	33.33				
เขวาสินรินทร์	5			4	80	1	20				
ศรีณรงค์	1	1	100								
โนนนารายณ์	4	4	100								
รวมจังหวัด	325	238	73.23	54	16.62	22	6.77	9	2.77	2	0.62

อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (PA)




ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (RR-TB, MDR-TB, Pre-XDR, XDR-TB) จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569




รายงานผู้ป่วยดื้อยา ปีงบประมาณ 2569

Pre-XDR-TB	1 ราย
MDR-TB	5 ราย
RR-TB	12 ราย
รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 ราย	



ที่มา : จากฐานข้อมูล NTIP และข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา สสจ.สุรินทร์ ณ วันที่ 22 ก.ค.69

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ สถานะกำลังรักษา จังหวัดสุรินทร์



ผู้ป่วยดื้อยาที่กำลังรักษา

MDR-TB 4 ราย

RR-TB 4 ราย

รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ราย

ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านวัณโรค จังหวัดสุรินทร์

- โรงพยาบาลทุกแห่ง พิจารณานำฟิล์ม CXR เดิม ที่ยังไม่ผ่านการอ่านโดย AI เข้าระบบให้ AI ช่วยอ่านฟิล์ม
- พื้นที่ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และเร่งรัดคีย์ข้อมูลคัดกรองในโปรแกรม NTIP ให้ได้ตามเป้าหมาย
- โรงพยาบาล และ รพ.สต. จัดช่องทางพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการไอ มากกว่า 2 สัปดาห์ (I-fast track) และพิจารณา CXR เพื่อค้นหาความผิดปกติ
- โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ Active CXR screening ในเคสที่มารับยาประจำใน รพ. ได้แก่ คลินิก สูงอายุ stroke โรคไต โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น (Big City Model)
- ผู้ป่วยสงสัยวัณโรค ให้พิจารณาส่งตรวจ Molecular First และติดตามผู้ป่วย AFB Neg ส่งตรวจ Molecular
- ขอเสนอให้ รพช.ทุกแห่ง หรือ Node สามารถตรวจ Molecular ได้ โดยมี TB-Lamp , X-pert
- ติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด ให้ได้รับการ CXR 100% ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี
- ติดตามผู้ป่วยขาดนัด/ขาดยา ในพื้นที่ ให้ไปพบแพทย์ตามนัด
- หากมีการขึ้นทะเบียนนอกเขตอำเภอ/จังหวัด ให้แจ้งมายังผู้รับผิดชอบงาน สสจ.สุรินทร์ เพื่อประสานแจ้งหน่วยงานตามที่อยู่ผู้ป่วยให้ติดตามผู้สัมผัส และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่
- พบผู้ป่วยดื้อยา RR-TB, MDR-TB, Pre-XDR-TB และ XDR-TB รายใหม่ทุกราย แจ้งมายังผู้รับผิดชอบงาน สสจ.สุรินทร์



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า


สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ.สุรินทร์ ปี 2569

ปี 2569

ข้อมูล ณ วันที่	ตรวจยืนยัน	เหตุการณ์ผิดปกติ
ก.ค. 69	โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 4 ตัวอย่าง อ. ศีขรภูมิ 1 ตย. - สุนัข = ต. ผักไหม (หัวที่2) ผู้สัมผัสฯ 7 คน อ. ปราสาท 1 ตย. - สุนัข = ต. บ้านไทร ผู้สัมผัสฯ 0 คน อ. ชุมพลบุรี 1 ตย. - สุนัข (จร) = ต.นาหนองไผ่ (หัวที่2) ผู้สัมผัสฯ 1 คน อ. กาบเชิง 1 ตย - โค = ต. แฉม (หัวที่ 2) ผู้สัมผัสฯ 3 คน	-
ยอดสะสม ปี 69 (1 ม.ค.- 23 ก.ค. 69)	โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 19 ตย. (ร้อยละ 25.00 (19/76) *ผู้สัมผัสที่ต้องฉีดฯ 98 คน	5 เหตุการณ์ (พนมดงรัก 2, สนม 1, บัวเขต1, เมืองฯ 1) ผู้สัมผัสต้องฉีดฯ 25 คน



สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569)



จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและ
จำนวนสัตว์พบเชื้อ ปี 2569

จำนวนสัตว์พบเชื้อ

202 ตัว

(อัตราพบเชื้อ 5.87)

(พบเชื้อสูงสุด: นครราชสีมา, ศรีสะเกษ
กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และมุกดาหาร)

จำนวนผู้เสียชีวิต

8

(จังหวัดระยอง นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา
อุบลราชธานี ตาก หนองคาย
ศรีสะเกษ และกาญจนบุรี)

รายละเอียดผู้เสียชีวิต/ผู้ป่วยยืนยัน ปี 2569

เพศ



7 ราย 1 ราย


สัญชาติ




7 ราย

1 ราย

ช่วงอายุ



ระยะฟักตัว




สัตว์สาเหตุ



ไม่ทราบชนิด
สัตว์ 1 ราย



สถานะการเลี้ยง



ผลการเคาะประตูบ้านค้นหาผู้สัมผัสมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2569

เดือน	ทั้งหมด (คน)	ได้รับวัคซีน (คน)					ไม่ได้รับวัคซีน (คน)		หมายเหตุ
		ทั้งหมด (ร้อยละ)	ครบชุด (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างฉีด ให้ครบชุด (ร้อยละ)	ฉีดไม่ครบชุด (ร้อยละ)	ติดตามรับ ไม่ครบชุด (ร้อยละ)	ทั้งหมด	ติดตาม แล้ว	
ก.ค.69	178	178 (100.00)	107 (60.11)	69 (38.76)	2 (1.12)	2 (100)	-	-	
ตค.68-กค. 69	2,072*	2,072 (100.00)	2,001 (96.57)	69 (3.33)	2 (0.10)	2 (100)	-	-	10 เดือน

ที่มา : รายงาน อสม.เคาะประตูบ้าน ก.ค.69
จาก รพ.รัตนบุรี, พนมดงรัก, ชุมพลบุรี, สีขรฯ, โนนนารายณ์
สสอ. เมืองฯ, รัตนบุรี, ชุมพลบุรี, ลำดวน, โนนนารายณ์
ณ *23 ก.ค.69



ผลการสำรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แบบฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-Exposure Prophylaxis) จังหวัดสุรินทร์

จำนวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง/ได้รับการฉีดฯ สะสม(คน)			พื้นที่ที่ เริ่มฉีดแล้ว
คนเก็บขยะ	ผู้ติดสุราเรื้อรัง	อื่นๆ	
167/75	150/14	207/101	รพ.ชุมพลฯ, ปราสาท, สังขะ, สุรินทร์, ศีขรภูมิ, เขวาสาน สสอ.เมืองสุรินทร์, ปราสาท, รัตนบุรี, เขวาสาน, ชุมพลบุรี

- หมายเหตุ : 1. รับรายงาน 17 หน่วยงาน จาก ทั้งหมด 34 หน่วยงาน
2. หน่วยงานที่รายงานว่าไม่มีประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ รพ.ท่าตูม, สนม
3. รพ.ปราสาท รายงานว่า คนเก็บขยะไม่ประสงค์ฉีด 10 ราย, ฉีดไม่ครบชุด 2 ราย

ที่มา : รายงานการสำรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ข้อมูล ณ 26 พ.ค.69
จาก รพ.สุรินทร์, ปราสาท, รัตนบุรี, ชุมพลบุรี, ท่าตูม, ลำดวน, บัวเชด, เขวาสานรินทร์, สังขะ, สนม, ศีขรภูมิ
สสอ.ปราสาท, โนนนารายณ์, เมืองสุรินทร์, รัตนบุรี, ชุมพลบุรี, เขวาสานรินทร์




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

ผลงานความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิด - 5 ปี จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2569 (เฉพาะไตรมาส 1 - 3) ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 2569 เวลา 14.00 น.



เกณฑ์ความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ความครอบคลุมวัคซีน MMR เข็ม 2 รายอำเภอจังหวัดสุรินทร์


ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 1-3 ณ 17 ก.ค.69



ผลงานความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิด - 5 ปี
 รายอำเภอของจังหวัดสุรินทร์
 ปีงบประมาณ 2569 (เฉพาะไตรมาส 1 - 3)
 ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 2569 เวลา 14.00 น.

ลำดับ	อำเภอ	กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี										ครบ 2 ปี				ครบ 3 ปี	ครบ 5 ปี	
		BCG	HBV1	DTP1	DTP3	HBV3	Hib3	Polio3	IPV	MMR1	Rota	DTP4	Polio4	LAJE1	MMR2	LAJE2	DTP5	Polio5
1	เมืองสุรินทร์	99.67	99.17	99.17	99.50	99.50	97.36	99.50	98.18	96.69	95.70	97.72	97.60	97.22	97.60	93.80	96.04	96.04
2	ชุมพลบุรี	100.00	99.32	99.32	99.32	99.32	98.63	94.52	99.32	98.63	97.26	97.29	97.74	98.19	97.74	95.63	98.58	98.58
3	ท่าตูม	98.87	98.50	98.50	98.50	98.50	97.37	98.12	98.50	96.62	96.24	100.00	100.00	99.29	96.80	96.69	96.58	96.58
4	จอมพระ	98.07	97.10	97.10	96.62	96.62	95.17	96.62	95.65	97.58	91.30	97.80	97.80	96.04	96.48	90.46	95.14	94.79
5	ปราสาท	99.66	97.26	97.26	97.26	97.26	93.14	96.23	93.48	95.88	88.68	94.90	94.48	94.05	92.07	86.35	90.17	90.17
6	กาบเชิง	99.42	98.83	98.83	98.83	98.83	97.08	97.66	94.15	97.66	90.06	93.67	94.12	91.86	92.31	90.14	92.28	91.51
7	รัตนบุรี	98.68	99.12	99.12	99.12	98.68	98.24	99.12	89.87	99.56	96.04	98.59	98.59	97.89	97.54	93.79	92.11	91.84
8	สนม	98.13	96.26	96.26	96.26	96.26	93.46	95.33	95.33	95.33	91.59	98.73	98.10	96.20	97.47	97.58	97.66	97.66
9	ศีขรภูมิ	99.03	98.79	98.79	97.57	97.57	96.84	92.72	95.15	97.57	94.66	95.00	95.00	95.19	94.07	92.77	91.24	90.94
10	สังขะ	98.94	97.87	96.81	97.02	97.02	94.68	95.11	96.60	95.32	92.55	95.69	95.87	95.69	93.90	86.31	89.12	89.12
11	ลำดวน	100.00	98.39	98.39	96.77	96.77	96.77	96.77	98.39	96.77	98.39	96.70	96.70	97.80	98.90	95.65	93.49	92.90
12	สำโรงทาบ	95.15	94.55	94.55	92.12	92.12	87.27	92.12	84.85	93.94	89.09	98.32	98.32	94.41	99.44	90.70	97.34	97.34
13	บัวเชด	100.00	98.68	98.68	98.68	98.68	96.03	98.01	98.68	99.34	95.36	95.88	95.29	95.88	95.88	95.60	98.74	98.74
14	พนมดงรัก	100.00	98.92	98.92	95.70	95.70	94.62	95.70	96.77	96.77	95.70	97.54	97.54	95.08	97.54	92.12	93.87	93.87
15	ศรีณรงค์	98.81	95.83	95.83	97.02	97.02	93.45	97.02	95.83	97.02	89.88	94.47	94.47	97.49	95.48	91.28	95.51	95.10
16	เขวาสินรินทร์	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.09	98.18	99.17	99.17	99.17	99.17	98.41	99.23	99.23
17	โนนนารายณ์	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.98	99.28	99.28	99.28	98.56	96.13	99.29	99.29
รวม		99.11	98.14	98.02	97.80	97.77	95.69	96.63	95.67	96.93	93.42	96.70	96.64	96.19	95.71	91.97	93.94	93.81

ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 9 สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 2569




เป้าหมาย จ.สุรินทร์ = 138,510	เป้าหมาย จ.บุรีรัมย์ = 155,630	เป้าหมาย จ.ชัยภูมิ = 116,920	เป้าหมาย จ.นครราชสีมา = 257,830
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 2569

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน
โนนนารายณ์	2000	1954
ศรีณรงค์	3000	2655
บัวเชด	2710	2370
ลำโรงทับ	5500	4595
สนม	4500	3709
ชุมพลบุรี	7600	6068
ท่าตูม	10000	7749
รัตนบุรี	12000	9280
พนมดงรัก	2200	1677
ลำดวน	3000	2247
ปราสาท	22000	16405
เขวาสินรินทร์	6000	4473
เมือง	28000	18942
กาบเชิง	5000	3119
เฉพาะ รพ.ค่ายฯ	700	370
จอมพระ	4300	2039
สังขะ	8000	3753
ศีขรภูมิ	12000	4403
รวม	138,510	95,808





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ระบบเฝ้าระวังAFP หัด หัดเยอรมัน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

เป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค AFP หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน AFP	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดการดำเนินงานหัด/หัดเยอรมัน	เป้าหมาย
1. อัตราการรายงานผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน ที่ไม่ใช่โปลิโอ(Non Polio AFP rate) (ไม่ต่ำกว่า 5 ราย)	มากกว่า 2 แส่นปชก.อายุต่ำกว่า 15 ปี	1. อัตราการรายงานผู้ป่วยไข่ออกฝิ่นที่ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน (ไม่ต่ำกว่า 28 ราย)	มากกว่า 2 ต่อแสนปชก.
2. ความครบถ้วนและความทันเวลาของการรายงาน Zero report	มากกว่า 90%	2. ความครบถ้วนและความทันเวลาของการรายงาน Zero report	มากกว่า 90%
3. สอบสวนโรคผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับรายงาน	มากกว่า 90%	3. สอบสวนโรคเฉพาะรายในผู้ป่วยไข่ออกฝิ่นหรือสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากพบผู้ป่วย	มากกว่า 80%
4. เก็บตัวอย่างอุจจาระได้ตามเกณฑ์ คือ 2 ตัวอย่าง ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายใน 14 วัน หลังมี อาการอ่อนแรง	มากกว่า 80%	4. เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยหัด/หัดเยอรมัน ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ	มากกว่า 80%
5. ติดตามอาการผู้ป่วยเมื่อครบ 60 วัน เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ป่วยยังมีอาการอ่อนแรงอยู่หรือไม่ (เฉพาะผู้ป่วยที่ครบ กำหนดติดตาม 60 วัน)	มากกว่า 80%	5. ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้รับภายใน 5 วัน หลังการเก็บตัวอย่าง	มากกว่า 80%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค AFP หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569

โรงพยาบาล	ผลการดำเนินงาน AFP				ผลการดำเนินงานหัด หัดเยอรมัน			
	จำนวนประชากร อายุต่ำกว่า 15 ปี	เป้าหมายการพบ ผู้ป่วย AFP	ผลการ ดำเนินงาน	อัตราการค้นหา ผู้ป่วย AFP	จำนวนประชากร ทุกกลุ่มอายุ	เป้าหมายการรายงานผู้ป่วยไข่ออก ผื่นที่ไม่ใช่หัด หัดเยอรมัน	ผลการ ดำเนินงาน	อัตราการรายงานผู้ป่วยที่ ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน
รพ.สุรินทร์	38,143	2	1	2.62	254,708	5	4	1.57
รพ.ชุมพลบุรี	10,009	1	0	0.00	69,716	2	0	0.00
รพ.ท่าตูม	13,016	1	0	0.00	93,609	2	0	0.00
รพ.จอมพระ	8,313	1	0	0.00	57,565	2	0	0.00
รพ.ปราสาท	24,005	2	0	0.00	150,974	3	0	0.00
รพ.กาบเชิง	9,872	1	0	0.00	59,546	2	0	0.00
รพ.รัตนบุรี	12,735	1	0	0.00	90,779	2	0	0.00
รพ.สนม	5,753	1	0	0.00	42,495	1	0	0.00
รพ.ศีขรภูมิ	19,283	1	0	0.00	132,622	3	0	0.00
รพ.สังขะ	21,332	2	0	0.00	129,646	3	0	0.00
รพ.ลำดวน	4,716	1	0	0.00	30,762	1	0	0.00
รพ.ลำโรงาบ	7,602	1	0	0.00	51,785	2	0	0.00
รพ.บัวเชด	6,991	1	0	0.00	41,326	1	0	0.00
รพ.ก.พนมดงรัก	6,197	1	0	0.00	37,475	1	0	0.00
รพ.ศรีณรงค์	7,216	1	1	13.86	46,235	1	1	2.16
รพ.เขวาสินรินทร์	4,439	1	0	0.00	33,493	1	0	0.00
รพ.โนนนารายณ์	4,874	1	0	0.00	34,364	1	0	0.00
จ.สุรินทร์	204,496		2	0.98	1,357,100		5	0.37

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ปี 2568

ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคที่ต้องกำจัดการควาดล้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

งาน HBV HCV OV-CCA




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี รายอำเภอจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : ในปี 2569 ประชากรที่เกิดก่อนปี 2535 และกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จำนวน 100,000 คน

ร้อยละ



ผลการคัดกรอง

- HBV = 83,052 ราย (83.05%)
Positive = 1,261 (1.52%)
- HCV = 89,984 ราย (89.48%)
Positive = 268 (0.30%)

แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได้รับการรักษาร้อยละ 60 , ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ได้รับการรักษาร้อยละ 80

❖ **HBV Positive** จำนวน 1,261 ราย (1.52%) ผล **confirm HBV Positive** = 1,143 ราย
ได้รับการรักษา 907 ราย (79.35%)

❖ ผลการรักษา HCV Positive = 268 (0.30%)
ได้รับการส่ง VL 215 ราย 96.85 (รอผล 46 ราย,
ผลลบ 13 ราย) จำนวนผู้ที่มีผลการตรวจยืนยันเป็นบวก
156 ราย (70.27%) จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
ได้รับการรักษา 140 ราย (89.74%)



แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569

แนวทางการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569



ใช้การตรวจด้วยอุจจาระตามแนวทางการคัดกรองของกรมควบคุมโรค

1 กลุ่มเป้าหมาย



อำเภอเสี่ยงสูง อ.รัตนบุรี อ.ท่าตูม อ.ชุมพลบุรี อ.จอมพระ
อ.บ้านเจด อ.สำโรงทาบ ปี 2568 พบพยาธิใบไม้ตับ 3)

ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

เช่น กินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวสุกๆ ดิบๆ



ก้อยปลา

2 ขั้นตอนการคัดกรอง


ลงทะเบียน



ประเมินความเสี่ยง



เก็บตัวอย่างอุจจาระ



3 วิธีการตรวจและวินิจฉัย



วิธี Modified Kato-Katz

ค้นหาไข่พยาธิใบไม้ตับ

ผลตรวจเป็นบวก (Positive)

ผลตรวจเป็นลบ (Negative)

ไข่พยาธิใบไม้ตับ



4 การบริหารจัดการและส่งต่อ



หากไม่พบไข่พยาธิ

แนะนำให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

และนัดตรวจซ้ำรายปี

หากพบไข่พยาธิ



จ่ายยาถ่ายพยาธิ (Praziquantel)

ให้ความรู้เรื่องพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี



ตรวจอัลตราซาวด์

(เฝ้าระวังมะเร็งท่อน้ำดี)
ในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป

อาหารสุก



สุขภาพดี

ตามแนวทางการคัดกรองกรมควบคุมโรค



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (OV) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : คัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระ จำนวน 5,500 คน

ผลงาน

- OV = 5,758 ราย (104.69%)
พบ OV = 46 ราย (0.80%)



แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรอง OVCCA จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี (CCA) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ จำนวน 2,000 คน

ผลงาน

ร้อยละ



- CCA = 2,487 ราย (124.40%)
ผลผิดปกติ 777 ราย (31.23%)
สงสัย CCA 3 ราย (0.12%)

แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรอง OVCCA จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



Avian Influenza

โรคไข้หวัดนก



สถานการณ์ไข้หวัดนก ประเทศกัมพูชา

จำนวนผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก H5N1 ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ ปี 2566 - 2569



ปี 2569 พบผู้ป่วย จำนวน 5 ราย ชาย 2 ราย หญิง 3 ราย

- รายที่ 4 รายงาน 22 เม.ย.69 เพศหญิง อายุ 66 ปี จ. สวายเรียง (เสียชีวิต)
- รายที่ 5 รายงาน 11 ก.ค.69 เพศหญิง อายุ 9 เดือน กรุงเทพมหานคร (กำลังรักษา)
- ปัจจัยเสี่ยง สัมผัส สัตว์ปีกที่ป่วยและตาย บริเวณบ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค.69)

ข้อมูลเพิ่มเติม ➡



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

10 อันดับโรค ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด

จังหวัดสุรินทร์

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน



ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (DDS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น.



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์

โรคติดต่อ นำโดย ยุงลาย

เดือน **กรกฎาคม** พ.ศ. 2569



ร่วมกันป้องกัน
กำจัดลูกน้ำยุงลาย
เพื่อชุมชนปลอดภัย ห่างไกลโรค



ประชุมกรรมการ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ด้านสาธารณสุข (กอบ.)

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569

ประเทศไทย

- ▶ จำนวนผู้ป่วย 15,661 ราย
อัตราป่วย 24.00 ต่อแสนประชากร
- ▶ จำนวนผู้เสียชีวิต **20 ราย**
อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.14
- ▶ ภาคที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
คือ ภาคใต้ 55.06
- ▶ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
คือ ภูเก็ต 229.51

เขต 9 นครราชสีมา

- ▶ จำนวนผู้ป่วย 681 ราย
อัตราป่วย 10.29 ต่อแสนประชากร
- ▶ ไม่มีรายงานเสียชีวิต
- ▶ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
คือ สุรินทร์ (22.62) , นครราชสีมา (7.83),
บุรีรัมย์ (7.35) และชัยภูมิ (4.89)

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569

จังหวัดสุรินทร์

ผู้ป่วย

สะสม **294** ราย

อัตราป่วย 21.66 ต่อแสนประชากร

ผู้เสียชีวิต

สะสม **0** ราย

อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.00

จังหวัดสุรินทร์ อันดับ 1 ของเขต อันดับที่ 31 ของประเทศ

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อแสนประชากร สูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 27.21) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี (ร้อยละ 21.77) และกลุ่มอายุ 15-19 (ร้อยละ 14.63) ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดสุรินทร์

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยปี 2569 กับ จำนวนผู้ป่วยปี 2568 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง


ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569



ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสม พบว่า ปี 2569 มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 182 ราย
น้อยกว่า จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี 2568 และมัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน

แผนภูมิแสดงอัตราป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569



อำเภอที่พบผู้ป่วย

14 จาก 17 อำเภอ

คิดเป็นร้อยละ 82.35%

ตำบลที่พบผู้ป่วย

79 จาก 159 ตำบล


คิดเป็นร้อยละ 49.69%

พื้นที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC ระดับอำเภอ โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2569



อำเภอศรีณรงค์ ดำเนินการเปิด EOC



อำเภอเข้าเกณฑ์เปิด EOC

1 แห่ง

ร้อยละ 5.88

อำเภอเสี่ยง

3 แห่ง

ร้อยละ 17.65

อำเภอที่ไม่เข้าเกณฑ์การระบาด

13 แห่ง

ร้อยละ 76.47

แบ่งระดับพื้นที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC ของโรคไข้เลือดออกระดับ

- เข้าเกณฑ์เปิด EOC (มีตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด > 25.00 %)
- เสี่ยง (มีตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด 10.01 – 25.00 %)
- ไม่ระบาด (มีตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด < 10.01 %)

ตารางแสดงตำบลเข้าเกณฑ์การระบาด โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2569

เมืองสุรินทร์	ปราสาท	ศีขรภูมิ	รัตนบุรี	สังขะ	ลำโรงทับ	ท่าตูม	จอมพระ	ชุมพลบุรี	สนม	กาบเชิง	บัวเชด	เขวาสินรินทร์	โนนนารายณ์	ลำดวน	ศรีณรงค์	พนมดงรัก
ในเมือง	ก้งแอน	ช่างบี่	รัตนบุรี	บ้านจารย์	เสมิง	โพนครก	จอมพระ	ชุมพลบุรี	โพนโก	ด่าน	จรัส	ตาตุก	หนองหลวง	โชคเหนือ	แฉกแวน	โคกกลาง
ราม	โชคนาสาม	ตรึม	แก	สะกาด	ลำโรงทับ	กระโพ	เมืองสิง	นาหนองไผ่	หนองระบิง	ตะเคียน	ตาวัง	เขวาสินรินทร์	คำผง	ลำดวน	ตรวจ	บักได
นาดี	ตาบี่	นารุง	ดอนแรด	กระเทียม	หนองไผ่ล้อม	หนองเมธี	กระหาด	ยะวี	สนม	กาบเชิง	บัวเชด	บึง	ระเวียง	อุโลก	หนองแวง	จิกแดก
ท่าสว่าง	ปรี้อ	ระแงง	หนองบัวบาน	สังขะ	กระออม	ท่าตูม	บุแกรง	กระเบื้อง	นานวน	คูตัน	สะเดา	ปราสาททอง	โนน	ตราดม	นรงค์	ตาเมียง
เมืองกี	ปราสาททง	จารพัด	ธาตุ	ขอนแก่น	หนองฮะ	พรมเทพ	หนองสนิท	ไพรขลา	แคน	นางมุด	อาโพน	บ้านแร่	หนองเทพ	ตระเปียงเตีย	ศรีสุข	
บุฤาษี	กันตจระมวล	ยาง	หนองบัวทอง	ดม	ศรีสุข	เมืองแก	บ้านฝื่อ	ศรีณรงค์	หัวจัว	โคกตะเคียน	ลำภาลูน					
กาเกาะ	ทมอ	แดล	ไผ่	พระแก้ว	เกาะแก้ว	บะ	ลุ่มระวี	เมืองบัว	หนองฮียอ							
นอกเมือง	ไพล	หนองบัว	เบิด	ตาตุม	หมื่นศรี	หนองบัว	ชุมแสง	สระขุด								
เจนียง	ทุ่งมน	คาละแมะ	น้ำเขียว	ทับกัน	สะโน	บัวโคก	เป็นสุข	หนองเรือ								
นาบัว	ตาเบา	หนองเหล็ก	กุดขาคิม	ตากง	ประดู่	ทุ่งกุลา										
ตั้งใจ	หนองใหญ่	หนองขาว	ยางสว่าง	บ้านชบ												
เพี้ยราม	โคกยาง	กุดหวาย	ทับใหญ่	เทพรักษา												
สลักได	โคกสะอาด	ขวาวใหญ่														
ตาอ็อง	บ้านไทร	ตรมไพร														
ลำโรง	เขื่อนเพลิง	ผักไหม														
แกใหญ่	บ้านพลวง															
คอโค	สมุด															
สวาย	ประกาดบุ															
เกนมีย																
ตระแสง																
แสงพันธิ์																

สถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ ปี 69 [ตามเกณฑ์ตำบลระบาด](#)
(ข้อมูลระหว่าง วันที่ 7 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2569)

เกณฑ์ระบาดระดับตำบล		จำนวนตำบล	ร้อยละของตำบลทั้งหมด
	ระบาดต่อเนื่อง (ผป. > median และพบ ผป. ต่อเนื่อง > 28 วัน)	12	7.55
	ระบาด (ผป. > median)	30	18.87
	เสี่ยง (ผป. = median)	7	4.40
	ปกติ (ผป. < median หรือไม่มี ผป.)	110	69.18

ที่มา : ซอฟต์แวร์ทันระบาด กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2569

การดำเนินงานโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569

ตำบล เข้าเกณฑ์การระบาดต่อเนื่อง
(ผป.> median และพบ ผป. ต่อเนื่อง > 28 วัน)

ตำบลณรงค์	อำเภอศรีณรงค์	(wk.7 – wk.11)	ตำบลเจนีง	อำเภอเมืองสุรินทร์	(wk.27)
ตำบลโคกยาง	อำเภอปราสาท	(wk.8 – wk.11)	ตำบลนาบัว	อำเภอเมืองสุรินทร์	(wk.27)
ตำบลบ้านจารย์	อำเภอสังखะ	(wk.8 – wk.28)	ตำบลด่าน	อำเภอกาบเชิง	(wk.27)
ตำบลสะกาด	อำเภอสังखะ	(wk.27- wk.28)	ตำบลช้างปี	อำเภอศีขรภูมิ	(wk.28)
ตำบลตรวจ	อำเภอศรีณรงค์	(wk.16 – wk.28)	ตำบลในเมือง	อำเภอเมืองสุรินทร์	(wk.28)
ตำบลแจนแวน	อำเภอศรีณรงค์	(wk.27 – wk.28)	ตำบลราม	อำเภอเมืองสุรินทร์	(wk.28)
ตำบลหนองแวง	อำเภอศรีณรงค์	(wk.27 – wk.28)			
ตำบลโชคนาสาม	อำเภอปราสาท	(wk.21 – wk.28)			
ตำบลกั้งแอน	อำเภอปราสาท	(wk.27 – wk.28)			
ตำบลตานี	อำเภอปราสาท	(wk.27 – wk.28)			

เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรกระดับจังหวัด (DCIR)

การดำเนินงานโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์


พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด	ผู้ป่วยรายแรก	ผู้ป่วยรายสุดท้าย	สิ้นสุดการเฝ้าระวัง
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ	20	17 ก.พ.69	14 มิ.ย.69	12 ก.ค.69
ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ	14	10 เม.ย.69	16 ก.ค.69	13 ส.ค.69
ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์	6	24 ก.พ.69	4 มิ.ย.69	2 ก.ค.69
ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์	23	3 ก.พ.69	10 ก.ค.69	7 ส.ค.69
ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์	12	2 มี.ค.69	29 มิ.ย.69	27 ก.ค.69
ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท	30	9 เม.ย.69	30 มิ.ย.69	28 ก.ค.69
ตำบลกั้งแอน อำเภอปราสาท	6	31 พ.ค.69	10 ก.ค.69	7 ส.ค.69
ตำบลตานี อำเภอปราสาท	10	25 เม.ย.69	16 ก.ค.69	13 ส.ค.69
ตำบลเจนียง อำเภอเมืองสุรินทร์	6	11 พ.ค.69	8 ก.ค.69	5 ส.ค.69
ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์	6	23 ม.ค.69	17 มิ.ย.69	15 ก.ค.69
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์	3	16 ม.ค.69	9 มิ.ย.69	7 ก.ค.69
ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์	4	26 พ.ค.69	10 ก.ค.69	7 ส.ค.69
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง	4	7 พ.ค.69	14 ก.ค.69	12 ส.ค.69



ผลการติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาด

ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนภูมิแสดงร้อยละ ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ค่า HI CI
ในสถานที่ 7 ร. ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



****ศตม./สสจ. ดำเนินการสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม**

ปัญหาอุปสรรค : ช่วงฤดูฝนทำให้มีแหล่งน้ำขังตลอด การดูภาชนะอาจไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ : กรณีช่วงการระบาด / ควรเข้มในการสำรวจ 2-3 ครั้ง/wk. และติดตามสุ่มตรวจโดยจนท.สาธารณสุข หรือ อสม.หมู่บ้านไขว้ ในพื้นที่ 7 ร.

: การจัดเก็บภาชนะ (ถังขยะที่ไม่ได้ใช้ ให้นำคว่ำ และเข้าที่ร่ม) / กรณีมีงานบุญที่วัด ขอความร่วมมือญาติโยม จัดกิจกรรมจิตอาสาในบริเวณรอบวัด

ผลการติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาด

ตำบลหนองแขว อำเภอสรรคบุรี จังหวัดสุรินทร์



พบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน

ตำบลหนองแขว อำเภอสรรคบุรี จังหวัดสุรินทร์



หมู่ 3	จำนวน 5 ราย	5 ราย
หมู่ 9	จำนวน 4 ราย	4 ราย
หมู่ 7	จำนวน 1 ราย	1 ราย
หมู่ 8	จำนวน 1 ราย	1 ราย
หมู่ 5	จำนวน 1 ราย	1 ราย

รวมทั้งสิ้น **12** ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2568



มาตรการการดำเนินงาน



เร่งดำเนินการมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ป้องกันไข้เลือดออก ไข้ฉุนๆ และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา



เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ



ควบคุมและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 อย่างต่อเนื่อง



ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

ในพื้นที่เสี่ยง



ติดตามค่า HI ทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะ

หมู่ที่มีผู้ป่วยและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง



เก็บบ้าน

ทำความสะอาดบ้าน
และบริเวณโดยรอบ



เก็บขยะ

กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย




เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะน้ำให้มิดชิด
เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน

ผลการติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาด

ตำบลหนองแวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์

แผนภูมิแสดงร้อยละ ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ค่า HI CI
ในสถานที่ 7 ร. ตำบลหนองแวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์



****ศตม./สสจ. ดำเนินการสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม**

ปัญหาอุปสรรค : ช่วงฤดูฝนทำให้มีแหล่งน้ำขังตลอด การดูภาชนะอาจไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ : กรณีช่วงการระบาด / ควรเข้มในการสำรวจ 2-3 ครั้ง/wk. และติดตามสุ่มตรวจโดยจนท.สาธารณสุข หรือ อสม.หมู่บ้านไขว้ ในพื้นที่ 7 ร.

: การจัดเก็บภาชนะ (ถังขยะที่ไม่ได้ใช้ ให้นำคว่ำ และเข้าที่ร่ม) / กรณีมีงานบุญที่วัด ขอความร่วมมือญาติโยม จัดกิจกรรมจิตอาสาในบริเวณรอบวัด


ข้อค้นพบ การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ติดต่อนำโดยยุ้งลาย

1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุ้งลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุ้งลายยังไม่ต่อเนื่อง
2. คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน ศพด. วัด เป็นต้น
3. รายงานโรคบางพื้นที่ ยังไม่ทันเวลา ตามมาตรการ 3 – 3 – 1
4. การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความตระหนัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ยังไม่ทั่วถึง
5. ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องเกิน 28 วัน ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือควบคุมโรคไม่ได้
6. เมื่อเข้าเหตุการณ์สอบสวนโรคของจังหวัด ยังขาดการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น เพื่อติดตามการประเมิน การเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่


แผนที่แสดงร้อยละ ค่าดัชนี **ลูกน้ำยุ่งลาย** ค่า HI (House Index) ในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์

4 สัปดาห์ย้อนหลัง


สัปดาห์ที่ 25
(14 – 26 มิ.ย.69)




สัปดาห์ที่ 26
(21– 27 มิ.ย.69)



สัปดาห์ที่ 27
(28 มิ.ย. – 4 ก.ค.69)




สัปดาห์ที่ 28
(5 – 7 ก.ค.69)



แผนภูมิแสดงร้อยละ ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย ตามพยากรณ์โรคและในพื้นที่ระบาด จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 11 กรกฎาคม 2569



เกณฑ์มาตรฐานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

ชุมชน (โรงเรียน) : $HI < 5$ | โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/รพ./บ้านพัก รพ./รพ.สต. : $CI = 0$ | วัด/สถานที่ราชการ/โรงแรม/โรงงาน : $CI < 5$

การประเมินความเสี่ยง

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569

จากข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และข้อมูลจากการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสุรินทร์ **มีความเสี่ยงปานกลาง** เนื่องจาก

- ▶ ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด ของปี 2569 **สถานการณ์มีแนวโน้มพบผู้ป่วยและตำบลเข้าเกณฑ์การระบาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องมีการติดตามควบคุมไม่ให้เกิด second generation (2nd gen)**
- ▶ มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ในช่วงฤดูการระบาดของปี 2568 **ปัจจุบันไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น**
- ▶ ผลการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดย ศตม.9.3 สุรินทร์ ในพื้นที่เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2568-2569 มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทั้งในชุมชนและสถานที่ 7ร ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- ▶ **สัดส่วนการใช้สารเคมีที่มีของพื้นที่ที่ ศตม. ดำเนินการสำรวจ ในปี พ.ศ. 2569 พบการใช้สารเชิงเดี่ยว ร้อยละ 100** ในการพ่นกำจัดยุงลาย ตัวเต็มวัย และบางพื้นที่ **ยังมีข้อจำกัดในการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย**

ผลการดำเนินงาน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Public Health Office



นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ติดตามการดำเนินงาน

โรคติดต่ออันตรายโดยยุงลาย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569



วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกนาสาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานี ทีม CDCU อำเภอปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาสาม อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน สถานศึกษาและผู้สูงอายุ ติดตามการดำเนินงานโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลายในพื้นที่ระบาด ณ ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลายในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคต่อการเกิดโรค ไข้เลือดออก รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลาย โดยมีกิจกรรมติดตามมาตรการ ควบคุมโรค 3-3-1 ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และสุ่มสำรวจคำดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ผลการสำรวจคำดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนหมู่ที่ 3 จำนวน 117 หลังคาเรือน พบ 36 หลังคาเรือน HI=30.77 หมู่ 9 จำนวน 122 หลังคาเรือน พบ 46 หลังคาเรือน HI=37.70 โรงเรียน บ้านเจ้าคุณ CI=8.33 โรงเรียนคานีวิทยา CI=29.23 พบภาชนะเสี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย คือ ภาชนะน้ำใช้ ยารอยยนต์ น้ำเลี้ยง สัตว์และภาชนะรองน้ำหลังตึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ให้คำแนะนำการเฝ้าระวัง ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้คำดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์



ภาพ : ช่าง

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทรศัพท์ : 044-558546, 558563, 558564
โทรสาร : 044-558546 ต่อ 101

<https://surin.moph.go.th/SPHO/>
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์



กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเบื้อง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์



นางยุภา เสงี่ยม
สาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี



นางสาวสิริฉัตร สายกระสุน
ผอ.รพ.สต.กระเบื้อง

การดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 10 บ้านม่วงราษฎร์เจริญ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 (ครั้งที่ 1)

งานป้องกันและควบคุมโรค รพ.สต.กระเบื้อง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กระเบื้อง และ อสม.ตำบลกระเบื้อง ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก หลังได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านม่วงราษฎร์เจริญ ตำบลกระเบื้อง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. สอบสวนโรคไข้เลือดออก

ลงพื้นที่สอบสวนข้อมูลผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุและแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย

2. พ่นสเปรย์กระพริบกำจัดยุงลาย

ดำเนินการพ่นในบ้านผู้ป่วย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 หลังจากได้รับรายงาน

3. พ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร

จากบ้านผู้ป่วย เพื่อลดการ แพร่กระจายของยุงลาย

4. สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ค่า HI = 12.45 CI = 6.25
คำดัชนีแสดงความเสี่ยงระดับปานกลาง

5. ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

ในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการป้องกันตนเอง

6. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน

ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม (จากการสำรวจ ณ วันที่ดำเนินการ)

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน



เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะและภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออก



เก็บบ้านให้สะอาด



เก็บขยะให้ถูกที่



ปิดภาชนะให้น้ำขัง



กำจัดแหล่งเพาะยุงลาย

งานควบคุมโรค รพ.สต.กระเบื้อง | โทร. 083-219-0398



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Public Health Office



นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ติดตามการดำเนินงาน

โรคติดต่ออันตรายโดยยุงลายและการดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569



วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ โรงพยาบาลศรีณรงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขวง ทีม CDCU อำเภอศรีณรงค์ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน สถานศึกษาและผู้สูงอายุ ติดตามการดำเนินงานโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลายในพื้นที่ระบาด และการดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ตำบลหนองแขวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลายในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคพยาธิใบไม้ตับ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลาย โดยมีกิจกรรมติดตามมาตรการควบคุมโรค 3-3-1 ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และสุ่มสำรวจคำดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ผลการสำรวจคำดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนหมู่ที่ 3 จำนวน 50 หลังคาเรือน พบ 17 หลังคาเรือน HI=34.00 หมู่ 9 จำนวน 50 หลังคาเรือน พบ 10 หลังคาเรือน HI=20.00 โรงเรียนบ้านทุ่ง CI=0.00 พบภาชนะเสี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย คือ ภาชนะน้ำใช้ จานรองกระถางต้นไม้ ถังใบพืช น้ำเลี้ยงสัตว์และภาชนะรองน้ำหลังตึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ให้คำแนะนำการเฝ้าระวัง ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้คำดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์



ภาพ : ช่าง

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทรศัพท์ : 044-558546, 558563, 558564
โทรสาร : 044-558546 ต่อ 101

<https://surin.moph.go.th/SPHO/>
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินติดตามการดำเนินงานโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลาย



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE


วัคซีนโรค

การค้นหา และขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB treatment coverage)
จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ

เป้าหมาย ร้อยละ 85 ของ 146/แสนประชากร			
อำเภอ	เป้าหมายการค้นหา (คน)	จำนวนการขึ้นทะเบียน (คน)	ร้อยละ
เมืองสุรินทร์	376	688	183.14
ชุมพลบุรี	99	33	33.38
ท่าตูม	133	86	64.90
จอมพระ	82	40	48.52
ปราสาท	216	271	125.48
กาบเชิง	87	36	41.20
รัตนบุรี	130	100	76.95
สนม	62	31	49.87
ศีขรภูมิ	194	116	59.92
สังขะ	187	129	69.14
ลำดวน	42	45	107.08
สำโรงทาบ	76	38	49.77
บัวเชด	53	32	59.97
พนมดงรัก	55	20	36.30
เขวาสินรินทร์	50	26	52.46
ศรีณรงค์	66	27	40.70
โนนนารายณ์	51	24	47.42
รวม	1,958	1,742	88.97

ร้อยละผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB treatment coverage)

จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ




ร้อยละการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

ประเภทผู้สัมผัส 7 กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย (ราย)	ร้อยละ ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์ NTIP (ราย)	ร้อยละ	Dx. TB (ราย)	ร้อยละ
1. ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด	4,084	100%	4,679	114.57	102	2.18
2. ผู้ต้องขังในเรือนจำ	3,578	100%	4,693	131.16	12	0.26
3. ผู้ติดเชื้อมีเอชไอวี	5,640	90%	5,473	97.04	48	0.88
4. ผู้ป่วยโรคที่ภูมิคุ้มกันลดลง						
4.1 ผู้ป่วยเบาหวาน (HbA1C $\geq$ 7mg%)	19,369	60%	18,719	96.64	39	0.21
4.2 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง	4,206	100%	5,439	129.32	25	0.46
5. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีโรคร่วม						
5.1 ผู้สูงอายุที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)	1,890	100%	1,840	97.35	37	2.01
5.2 ผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวาน	14,194	60%	11,276	79.44	23	0.20
6. ผู้ใช้สารเสพติด	3,140	100%	2,770	88.22	81	2.92
7. บุคลากรสาธารณสุข	9,083	100%	9,013	99.23	5	0.06
รวม	65,184		63,902	98.03	372	0.58

อำเภอ	CXR รวม 7 กลุ่มเสี่ยง				
	เป้าหมายรวม	ผลลัพท์ NTIP (ราย)	ร้อยละ	Dx. TB (ราย)	ร้อยละ
เมืองสุรินทร์	21,789	20,402	93.63	114	0.56
ชุมพลบุรี	2,518	2,587	102.74	-	-
ท่าตูม	3,340	3,423	102.49	9	0.26
จอมพระ	2,304	2,328	101.04	23	0.99
ปราสาท	4,755	3,734	78.53	14	0.37
กาบเชิง	1,470	2,099	142.79	20	0.95
รัตนบุรี	7,786	6,161	79.13	35	0.57
สนม	1,655	1,798	108.64	24	1.33
ศีขรภูมิ	5,030	5,647	112.27	14	0.25
สังขะ	3,380	3,578	105.86	28	0.78
ลำดวน	2,368	2,720	114.86	32	1.18
สำโรงทาบ	1,699	1,650	97.12	3	0.18
บัวเชด	2,021	2,030	100.45	10	0.49
พนมดงรัก	1,137	1,246	109.59	4	0.32
เขวาสินรินทร์	1,714	1,960	114.35	14	0.71
ศรีณรงค์	1,348	1,520	112.76	9	0.59
โนนนารายณ์	870	1,019	117.13	19	1.86
รวม	65,184	63,902	98.03	372	0.58

ร้อยละการ CXR ประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ (ภาพรวมทุกกลุ่มเสี่ยง)



การคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ

ที่มา : จากฐานข้อมูล NTIP ณ วันที่ 22 ก.ค. 69

อำเภอ	1. ผู้สัมผัส (คน) เป้าหมาย 100%			2. ผู้ต้องขังเรือนจำ (คน) เป้าหมาย 100%			3. HIV (คน) เป้าหมาย 90%		
	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%
เมืองสุรินทร์	800	794	99.25	2,009	3,068	152.71	2,598	2,653	102.12
ชุมพลบุรี	300	204	68.00				223	223	100.00
ท่าตูม	339	659	194.40				101	187	185.15
จอมพระ	159	182	114.47				130	149	114.62
ปราสาท	300	259	86.33				650	240	36.92
กาบเชิง	100	213	213.00				180	179	99.44
รัตนบุรี	360	364	101.11	1,596	1,625	103.57	338	343	101.48
สนม	114	121	106.14				99	100	101.01
ศีขรภูมิ	300	358	119.33				374	361	96.52
สังขะ	280	388	138.57				300	352	117.33
ลำดวน	288	306	106.25				218	172	78.90
สำโรงทาบ	168	100	59.52				80	83	103.75
บัวเชด	63	85	134.92				135	135	100.00
พนมดงรัก	63	70	111.11				80	78	97.50
เขวาสินรินทร์	234	273	116.67				63	70	111.11
ศรีณรงค์	111	114	102.70				30	95	316.67
โนนนารายณ์	105	189	180.00				41	53	129.27
รวมจังหวัด	4,084	4,679	114.57	3,578	4,693	131.16	5,640	5,473	97.04

อำเภอ	4. โรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง (คน)					
	4.1 ผู้ป่วยเบาหวาน (HbA1C ≥ 7mg%) เป้าหมาย 60%			4.2 ผู้ป่วยไตเรื้อรัง เป้าหมาย 100%		
	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%
เมืองสุรินทร์	6,064	5,843	96.36	1,225	1,684	137.47
ชุมพลบุรี	900	982	109.11	300	311	103.67
ท่าตูม	1,700	1,330	78.24	300	175	58.33
จอมพระ	402	489	121.64	27	68	251.85
ปราสาท	1,000	923	92.30	300	523	174.33
กาบเชิง	600	764	127.33	50	124	248.00
รัตนบุรี	1,880	1,192	63.40	331	598	180.66
สนม	493	502	101.83	225	258	114.67
ศีขรภูมิ	1,506	1,387	92.10	429	436	101.63
สังขะ	1,200	1,206	100.50	200	212	106.00
ลำดวน	318	810	254.72	242	304	125.62
สำโรงทาบ	719	524	72.88	90	90	100.00
บัวเชด	870	820	94.25	131	138	105.34
พนมดงรัก	430	494	114.88	62	71	114.52
เขวาสินรินทร์	350	406	116.00	120	229	190.83
ศรีณรงค์	667	707	106.00	114	121	106.14
โนนนารายณ์	270	340	125.93	60	97	161.67
รวมจังหวัด	19,369	18,719	96.64	4,206	5,439	129.32

อำเภอ	5. ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป มีโรคร่วม (คน)					
	5.1 65 ปี ขึ้นไป มีโรค COPD เป้าหมาย 100%			5.2 65 ปี ขึ้นไป มีโรคเบาหวาน เป้าหมาย 60%		
	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%
เมืองสุรินทร์	330	292	88.48	4,850	2,694	55.55
ชุมพลบุรี	125	126	100.80	300	372	124.00
ท่าตูม	100	117	117.00	100	255	255.00
จอมพระ	99	109	110.10	1,109	942	84.94
ปราสาท	250	122	48.80	1,000	801	80.10
กาบเชิง	80	93	116.25	150	275	183.33
รัตนบุรี	234	202	86.32	2,174	1,011	46.50
สนม	72	72	100.00	338	366	108.28
ศีขรภูมิ	123	153	124.39	1,379	1,837	133.21
สังขะ	100	105	105.00	500	463	92.60
ลำดวน	69	74	107.25	833	626	75.15
สำโรงทาบ	65	83	127.69	218	350	160.55
บัวเชด	70	99	141.43	334	336	100.60
พนมดงรัก	40	56	140.00	200	213	106.50
เขวาสินรินทร์	72	73	101.39	500	520	104.00
ศรีณรงค์	30	42	140.00	72	131	181.94
โนนนารายณ์	31	22	70.97	137	84	61.31
รวมจังหวัด	1,890	1,840	97.35	14,194	11,276	79.44

การคัดกรองวัคซีนโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ


ที่มา : จากฐานข้อมูล NTIP ณ วันที่ 22 ก.ค. 69

อำเภอ	6. ผู้ใช้สารเสพติด (คน) เป้าหมาย 100%			7. บุคลากรสาธารณสุข (คน) เป้าหมาย 100%		
	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%
เมืองสุรินทร์	741	463	62.48	3,172	2,911	91.77
ชุมพลบุรี	90	78	86.67	280	291	103.93
ท่าตูม	200	246	123.00	500	454	90.80
จอมพระ	138	149	107.97	240	240	100.00
ปราสาท	300	38	12.67	955	828	86.70
กาบเชิง	50	94	188.00	260	357	137.31
รัตนบุรี	380	294	77.37	520	532	102.31
สนม	95	120	126.32	219	259	118.26
ศีขรภูมิ	125	146	116.80	794	969	122.04
สังขะ	200	222	111.00	600	630	105.00
ลำดวน	106	119	112.26	294	309	105.10
สำโรงทาบ	90	177	196.67	269	243	90.33
บัวเชด	181	177	97.79	237	240	101.27
พนมดงรัก	54	54	100.00	208	210	100.96
เขวาสินรินทร์	200	211	105.50	175	178	101.71
ศรีณรงค์	130	109	83.85	194	201	103.61
โนนนารายณ์	60	73	121.67	166	161	96.99
รวมจังหวัด	3,140	2,770	88.22	9,083	9,013	99.23


จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) ปึงบประมาณ พ.ศ.2569 (PA) จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด	รักษาสำเร็จ	%	กำลังรักษา	%	ตาย	%	ขาดยา	%	โอนออก	%
เมืองสุรินทร์	142	107	75.35	27	19.01	7	4.93	1	0.70		
ชุมพลบุรี	5	5	100								
ท่าตูม	20	15	75	3	15	2	10				
จอมพระ	7	2	28.57	5	71.43						
ปราสาท	65	52	80			6	9.23	7	10.77		
กาบเชิง	6	5	83.33							1	16.67
รัตนบุรี	17	7	41.18	7	41.18	2	11.76	1	5.88		
สนม	4	4	100								
ศีขรภูมิ	16	11	68.75	4	25	1	6.25				
สังขะ	10	8	80	1	10	1	10				
ลำดวน	8	5	62.50	2	25					1	12.50
สำโรงทาบ	7	7	100								
บัวเชด	5	3	60	1	20	1	20				
พนมดงรัก	3	2	66.67			1	33.33				
เขวาสินรินทร์	5			4	80	1	20				
ศรีณรงค์	1	1	100								
โนนนารายณ์	4	4	100								
รวมจังหวัด	325	238	73.23	54	16.62	22	6.77	9	2.77	2	0.62


อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (PA)




ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (RR-TB, MDR-TB, Pre-XDR, XDR-TB) จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569



รายงานผู้ป่วยดื้อยา ปีงบ 2569	
Pre-XDR-TB	1 ราย
MDR-TB	5 ราย
RR-TB	12 ราย
รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 ราย	




ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ สถานะกำลังรักษา จังหวัดสุรินทร์





แนวทางการตรวจวินิจฉัย วัณโรคและวัณโรคดื้อยาประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569)



แนวทางการตรวจวินิจฉัย วัณโรคและวัณโรคดื้อยาประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569)

วัณโรค (Tuberculosis: TB) ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย โดยมีอัตราป่วยและเสียชีวิตในระดับสูง แม้จะมีความก้าวหน้าในการรักษา แต่ความล่าช้าในการวินิจฉัยยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการควบคุมโรค การตรวจวินิจฉัยแบบดั้งเดิม โดยการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (smear microscopy) เป็นวิธีที่ใช้มานาน แต่มีข้อจำกัดด้านความไว โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีจำนวนเชื้อน้อยหรือในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับแนวทางการวินิจฉัยวัณโรคให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยใช้การตรวจทางอณูชีววิทยา (Molecular Diagnostics) เป็นลำดับแรก หรือ Molecular First Approach เช่น การตรวจ Xpert MTB/RIF, TB-LAMP หรือ Molecular อื่น ๆ ซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง ช่วยให้สามารถเริ่มการรักษาได้อย่างทันท่วงที ลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรควัณโรคของประเทศ

หลักการสำคัญ


ใช้การตรวจทางอณูชีววิทยา


เช่น การตรวจ Xpert MTB/RIF, TB-LAMP หรือ Molecular อื่นๆ เป็นการตรวจลำดับแรก (Molecular first) ในผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรคหรือมีผล CXR ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาได้อย่างรวดเร็ว

แนะนำให้ทดสอบความไวต่อยา (Drug Susceptibility Testing : DST)

ทั้ง 2 ชนิด คือ Rifampicin และ Isoniazid ในผู้ป่วยทุกรายที่แพทย์วินิจฉัยเป็นวัณโรค

Molecular first + DST (INH + RIF) 100%





ผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรค หรือ มีผล CXR ผิดปกติ เข้าได้กับวัณโรค

อาจพิจารณาส่งตรวจ AFB ร่วมได้

ส่งสิ่งส่งตรวจด้วย molecular testing กรณี MTB Detected ตรวจความไวต่อยา H และ R ทุกราย

ไวต่อทั้ง
H และ R

ดื้อ H (ผู้ป่วยวัณโรค Hr-TB)

ดื้อ R (ผู้ป่วยวัณโรค RR-TB)
ดื้อ H+R (ผู้ป่วยวัณโรค MDR-TB)

กรณี Primary RR/MDR-TB
แจ้ง SRRT จังหวัด
เพื่อสอบสวนโรค

DS-TB

ติดตามผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษ และขึ้นทะเบียนในโปรแกรม NTIP* **ภายใน 7 วัน** และติดตามผู้สัมผัส

*กรณีดื้อยาชนิด primary : ขึ้นทะเบียน TB -> ปิดเคสเป็น "RR/MDR ก่อนเดือนที่ 5" -> ขึ้นทะเบียน PMDT

กรณีดื้อยา ให้ผู้ป่วยเก็บสิ่งส่งตรวจมาส่งในวันรุ่งขึ้น (collected specimen) **จำนวน 2 กระปุก**

กระปุกที่ 1 ส่งตรวจ molecular testing (SLD PCR)

กระปุกที่ 2 ส่งเพาะเชื้อ แบบ liquid culture และ/หรือ

ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านวัณโรค จังหวัดสุรินทร์


- โรงพยาบาลทุกแห่ง พิจารณานำฟิล์ม CXR เดิม ที่ยังไม่ผ่านการอ่านโดย AI เข้าระบบให้ AI ช่วยอ่านฟิล์ม
- พื้นที่ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และเร่งรัดคีย์ข้อมูลคัดกรองในโปรแกรม NTIP ให้ได้ตามเป้าหมาย
- โรงพยาบาล และ รพ.สต. จัดช่องทางพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการไอ มากกว่า 2 สัปดาห์ (I-fast track) และพิจารณา CXR เพื่อค้นหาความผิดปกติ
- โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ Active CXR screening ในเคสที่มารับยาประจำใน รพ. ได้แก่ คลินิก สูงอายุ stroke โรคไต โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น (Big City Model)
- ผู้ป่วยสงสัยวัณโรค ให้พิจารณาส่งตรวจ Molecular First และติดตามผู้ป่วย AFB Neg ส่งตรวจ Molecular
- ขอเสนอให้ รพช.ทุกแห่ง หรือ Node สามารถตรวจ Molecular ได้ โดยมี TB-Lamp , X-pert
- ติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด ให้ได้รับการ CXR 100% ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี
- ติดตามผู้ป่วยขาดนัด/ขาดยา ในพื้นที่ ให้ไปพบแพทย์ตามนัด
- หากมีการขึ้นทะเบียนนอกเขตอำเภอ/จังหวัด ให้แจ้งมายังผู้รับผิดชอบงาน สสจ.สุรินทร์ เพื่อประสานแจ้งหน่วยงานตามที่อยู่ ผู้ป่วยให้ติดตามผู้สัมผัส และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่
- พบผู้ป่วยดื้อยา RR-TB, MDR-TB, Pre-XDR-TB และ XDR-TB รายใหม่ทุกราย แจ้งมายังผู้รับผิดชอบงาน สสจ.สุรินทร์



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียดผู้เสียชีวิต ปี 2569





สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

ปี 2569

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป ณ 23 ก.ค.69

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ.สุรินทร์ ปี 2569





ข้อมูล ณ วันที่	ตรวจยืนยัน	เหตุการณ์ผิดปกติ
ก.ค. 69	โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 4 ตัวอย่าง <u>อ. ศีขรภูมิ</u> 1 ตย. - สุนัข = ต. ผักไหม (หัวที่2) ผู้สัมผัสฯ 7 คน <u>อ. ปราสาท</u> 1 ตย. - สุนัข = ต. บ้านไทร ผู้สัมผัสฯ 0 คน <u>อ. ชุมพลบุรี</u> 1 ตย. - สุนัข (จร) = ต.นาหนองไผ่ (หัวที่2) ผู้สัมผัสฯ 1 คน <u>อ. กาบเชิง</u> 1 ตย. - โค = ต. แฉ่งมุด (หัวที่ 2) ผู้สัมผัสฯ 3 คน	-
ยอดสะสม ปี 69 (1 ม.ค.- 23 ก.ค. 69)	19 ตย. (ร้อยละ 25.00 (19/76) *ผู้สัมผัสที่ต้องฉีดฯ 98 คน	5 เหตุการณ์ (พนมดงรัก 2, สนม 1, บัวเชด1, เมืองฯ 1) ผู้สัมผัสต้องฉีดฯ 25 คน

ผลการเคาะประตูบ้านค้นหาผู้สัมผัสมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2569

เดือน	ทั้งหมด (คน)	ได้รับวัคซีน (คน)					ไม่ได้รับวัคซีน (คน)		หมายเหตุ
		ทั้งหมด (ร้อยละ)	ครบชุด (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างฉีด ให้ครบชุด (ร้อยละ)	ฉีดไม่ครบชุด (ร้อยละ)	ติดตามรับ ไม่ครบชุด (ร้อยละ)	ทั้งหมด	ติดตาม แล้ว	
ก.ค.69	178	178 (100.00)	107 (60.11)	69 (38.76)	2 (1.12)	2 (100)	-	-	
ตค.68-กค. 69	2,072*	2,072 (100.00)	2,001 (96.57)	69 (3.33)	2 (0.10)	2 (100)	-	-	10 เดือน

ที่มา : รายงาน อสม.เคาะประตูบ้าน ก.ค.69
จาก รพ.รัตนบุรี, พนมดงรัก, ชุมพลบุรี, ศีขรฯ, โนนนารายณ์
สสอ. เมืองฯ, รัตนบุรี, ชุมพลบุรี, ลำดวน, โนนนารายณ์
ณ *23 ก.ค.69



ผลการสำรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แบบฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-Exposure Prophylaxis) จังหวัดสุรินทร์

จำนวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง/ได้รับการฉีดฯ สะสม(คน)			พื้นที่ที่ เริ่มฉีดแล้ว
คนเก็บขยะ	ผู้ติดสุราเรื้อรัง	อื่นๆ	
167/75	150/14	207/101	รพ.ชุมพลฯ, ปราสาท, สังขะ, สุรินทร์, คีขจรภูมิ, เขวาสาน สสอ.เมืองสุรินทร์, ปราสาท, รัตนบุรี, เขวาสาน, ชุมพลบุรี

- หมายเหตุ : 1. รับรายงาน 17 หน่วยงาน จาก ทั้งหมด 34 หน่วยงาน
2. หน่วยงานที่รายงานว่าไม่มีประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ รพ.ท่าตูม, สนม
3. รพ.ปราสาท รายงานว่า คนเก็บขยะไม่ประสงค์ฉีด 10 ราย, ฉีดไม่ครบชุด 2 ราย

ที่มา : รายงานการสำรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ข้อมูล ณ 26 พ.ค.69
จาก รพ.สุรินทร์, ปราสาท, รัตนบุรี, ชุมพลบุรี, ท่าตูม, ลำดวน, บัวเชด, เขวาสานรินทร์, สังขะ, สนม, คีขจรภูมิ
สสอ.ปราสาท, โนนนารายณ์, เมืองสุรินทร์, รัตนบุรี, ชุมพลบุรี, เขวาสานรินทร์

ขอความร่วมมือ

1. ประชาสัมพันธ์

- โรคพิษสุนัขบ้ามีอาการแล้วรักษาไม่หาย ตายทุกราย แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 - เมื่อถูกสุนัข-แมว กัด ข่วน เลียแผล “ล้างแผล ใส่ยา ทาหม้อ ฉีดวัคซีนต่อตามกำหนดนัด”
 - -ลูกสุนัข-แมวที่อายุต่ำกว่า 3 เดือน อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หากไม่พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 - เมื่อสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข, แมว, โค, กระบือ ป่วย/มีอาการผิดปกติและตาย ไม่นำไปชำแหละ
- โดยเฉพาะโค-กระบืออย่านำไปรับประทาน ให้ประสานจนท.ปศุสัตว์ เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
- หากเลี้ยงสุนัข-แมว ต้องพาไปรับวัคซีนป้องกันโรคปีละ 1 ครั้ง



2. ประสาน อสม.เคาะประตูบ้าน เดือนละ 1 ครั้ง

- ค้นหาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ถูกสุนัข/แมว กัด/ข่วน/เลียแผล/ชำแหละสัตว์/ทานอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ) ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด
- เผื่อระวังและแจ้งเหตุการณ์แก่จนท.สาธารณสุข หากมีสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

3. จัดให้มีระบบติดตามผู้รับบริการฉีดวัคซีน ให้ครบชุด




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

ผลงานความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิด - 5 ปี จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2569 (เฉพาะไตรมาส 1 - 3) ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 2569 เวลา 14.00 น.



เกณฑ์ความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ความครอบคลุมวัคซีน MMR เข็ม 2 รายอำเภอจังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 1-3 ณ 17 ก.ค.69




ผลงานความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิด - 5 ปี
 รายอำเภอของจังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2569 (เฉพาะไตรมาส 1 - 3)
 ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 2569 เวลา 14.00 น.

ลำดับ	อำเภอ	กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี										ครบ 2 ปี				ครบ 3 ปี	ครบ 5 ปี	
		BCG	HBV1	DTP1	DTP3	HBV3	Hib3	Polio3	IPV	MMR1	Rota	DTP4	Polio4	LAJE1	MMR2	LAJE2	DTP5	Polio5
1	เมืองสุรินทร์	99.67	99.17	99.17	99.50	99.50	97.36	99.50	98.18	96.69	95.70	97.72	97.60	97.22	97.60	93.80	96.04	96.04
2	ชุมพลบุรี	100.00	99.32	99.32	99.32	99.32	98.63	94.52	99.32	98.63	97.26	97.29	97.74	98.19	97.74	95.63	98.58	98.58
3	ท่าตูม	98.87	98.50	98.50	98.50	98.50	97.37	98.12	98.50	96.62	96.24	100.00	100.00	99.29	96.80	96.69	96.58	96.58
4	จอมพระ	98.07	97.10	97.10	96.62	96.62	95.17	96.62	95.65	97.58	91.30	97.80	97.80	96.04	96.48	90.46	95.14	94.79
5	ปราสาท	99.66	97.26	97.26	97.26	97.26	93.14	96.23	93.48	95.88	88.68	94.90	94.48	94.05	92.07	86.35	90.17	90.17
6	กาบเชิง	99.42	98.83	98.83	98.83	98.83	97.08	97.66	94.15	97.66	90.06	93.67	94.12	91.86	92.31	90.14	92.28	91.51
7	รัตนบุรี	98.68	99.12	99.12	99.12	98.68	98.24	99.12	89.87	99.56	96.04	98.59	98.59	97.89	97.54	93.79	92.11	91.84
8	สนม	98.13	96.26	96.26	96.26	96.26	93.46	95.33	95.33	95.33	91.59	98.73	98.10	96.20	97.47	97.58	97.66	97.66
9	ศีขรภูมิ	99.03	98.79	98.79	97.57	97.57	96.84	92.72	95.15	97.57	94.66	95.00	95.00	95.19	94.07	92.77	91.24	90.94
10	สังขะ	98.94	97.87	96.81	97.02	97.02	94.68	95.11	96.60	95.32	92.55	95.69	95.87	95.69	93.90	86.31	89.12	89.12
11	ลำดวน	100.00	98.39	98.39	96.77	96.77	96.77	96.77	98.39	96.77	98.39	96.70	96.70	97.80	98.90	95.65	93.49	92.90
12	สำโรงทาบ	95.15	94.55	94.55	92.12	92.12	87.27	92.12	84.85	93.94	89.09	98.32	98.32	94.41	99.44	90.70	97.34	97.34
13	บัวเชด	100.00	98.68	98.68	98.68	98.68	96.03	98.01	98.68	99.34	95.36	95.88	95.29	95.88	95.88	95.60	98.74	98.74
14	พนมดงรัก	100.00	98.92	98.92	95.70	95.70	94.62	95.70	96.77	96.77	95.70	97.54	97.54	95.08	97.54	92.12	93.87	93.87
15	ศรีณรงค์	98.81	95.83	95.83	97.02	97.02	93.45	97.02	95.83	97.02	89.88	94.47	94.47	97.49	95.48	91.28	95.51	95.10
16	เขวาสินรินทร์	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.09	98.18	99.17	99.17	99.17	99.17	98.41	99.23	99.23
17	โนนนารายณ์	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.98	99.28	99.28	99.28	98.56	96.13	99.29	99.29
รวม		99.11	98.14	98.02	97.80	97.77	95.69	96.63	95.67	96.93	93.42	96.70	96.64	96.19	95.71	91.97	93.94	93.81

ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เขตสุขภาพที่ 9 สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 2569




เป้าหมาย จ.สุรินทร์ = 138,510	เป้าหมาย จ.บุรีรัมย์ = 155,630	เป้าหมาย จ.ชัยภูมิ = 116,920	เป้าหมาย จ.นครราชสีมา = 257,830
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 2569

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน
โนนนารายณ์	2000	1954
ศรีณรงค์	3000	2655
บัวเชด	2710	2370
ลำโรงทับ	5500	4595
สนม	4500	3709
ชุมพลบุรี	7600	6068
ท่าตูม	10000	7749
รัตนบุรี	12000	9280
พนมดงรัก	2200	1677
ลำดวน	3000	2247
ปราสาท	22000	16405
เขวาสินรินทร์	6000	4473
เมือง	28000	18942
กาบเชิง	5000	3119
เฉพาะ รพ.ค่ายฯ	700	370
จอมพระ	4300	2039
สังขะ	8000	3753
ศีขรภูมิ	12000	4403
รวม	138,510	95,808





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ระบบเฝ้าระวังAFP หัด หัดเยอรมัน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

เป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค AFP หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน AFP	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดการดำเนินงานหัด/หัดเยอรมัน	เป้าหมาย
1. อัตราการรายงานผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน ที่ไม่ใช่โปลิโอ(Non Polio AFP rate) (ไม่ต่ำกว่า 5 ราย)	มากกว่า 2 แส่นปชก.อายุต่ำกว่า 15 ปี	1. อัตราการรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่นที่ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน (ไม่ต่ำกว่า 28 ราย)	มากกว่า 2 ต่อแสนปชก.
2. ความครบถ้วนและความทันเวลาของการรายงาน Zero report	มากกว่า 90%	2. ความครบถ้วนและความทันเวลาของการรายงาน Zero report	มากกว่า 90%
3. สอบสวนโรคผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับรายงาน	มากกว่า 90%	3. สอบสวนโรคเฉพาะรายในผู้ป่วยไข่ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากพบผู้ป่วย	มากกว่า 80%
4. เก็บตัวอย่างอุจจาระได้ตามเกณฑ์ คือ 2 ตัวอย่าง ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายใน 14 วัน หลังมี อาการอ่อนแรง	มากกว่า 80%	4. เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยหัด/หัดเยอรมัน ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ	มากกว่า 80%
5. ติดตามอาการผู้ป่วยเมื่อครบ 60 วัน เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ป่วยยังมีอาการอ่อนแรงอยู่หรือไม่ (เฉพาะผู้ป่วยที่ครบ กำหนดติดตาม 60 วัน)	มากกว่า 80%	5. ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้รับภายใน 5 วัน หลังการเก็บตัวอย่าง	มากกว่า 80%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค AFP หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569

โรงพยาบาล	ผลการดำเนินงาน AFP				ผลการดำเนินงานหัด หัดเยอรมัน			
	จำนวนประชากร อายุต่ำกว่า 15 ปี	เป้าหมายการพบ ผู้ป่วย AFP	ผลการ ดำเนินงาน	อัตราการค้นหา ผู้ป่วย AFP	จำนวนประชากร ทุกกลุ่มอายุ	เป้าหมายการรายงานผู้ป่วยไข่ออก ผื่นที่ไม่ใช่หัด หัดเยอรมัน	ผลการ ดำเนินงาน	อัตราการรายงานผู้ป่วยที่ ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน
รพ.สุรินทร์	38,143	2	1	2.62	254,708	5	4	1.57
รพ.ชุมพลบุรี	10,009	1	0	0.00	69,716	2	0	0.00
รพ.ท่าตูม	13,016	1	0	0.00	93,609	2	0	0.00
รพ.จอมพระ	8,313	1	0	0.00	57,565	2	0	0.00
รพ.ปราสาท	24,005	2	0	0.00	150,974	3	0	0.00
รพ.กาบเชิง	9,872	1	0	0.00	59,546	2	0	0.00
รพ.รัตนบุรี	12,735	1	0	0.00	90,779	2	0	0.00
รพ.สนม	5,753	1	0	0.00	42,495	1	0	0.00
รพ.ศีขรภูมิ	19,283	1	0	0.00	132,622	3	0	0.00
รพ.สังขะ	21,332	2	0	0.00	129,646	3	0	0.00
รพ.ลำดวน	4,716	1	0	0.00	30,762	1	0	0.00
รพ.ลำโรงาบ	7,602	1	0	0.00	51,785	2	0	0.00
รพ.บัวเชด	6,991	1	0	0.00	41,326	1	0	0.00
รพ.ก.พนมดงรัก	6,197	1	0	0.00	37,475	1	0	0.00
รพ.ศรีณรงค์	7,216	1	1	13.86	46,235	1	1	2.16
รพ.เขวาสินรินทร์	4,439	1	0	0.00	33,493	1	0	0.00
รพ.โนนนารายณ์	4,874	1	0	0.00	34,364	1	0	0.00
จ.สุรินทร์	204,496		2	0.98	1,357,100		5	0.37

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ปี 2568



ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคที่ต้องกำจัดการควาตล่างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569



โรงพยาบาล	จำนวนประชากร ทุกกลุ่มอายุ	เป้าหมายการรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่นที่ไม่ใช่หัด หัดเยอรมัน (ราย)	จำนวนผู้ป่วยที่เข้านิยามหัด/หัดเยอรมัน (ราย)	จำนวนผู้ป่วยไข่ออกผื่นที่ รายงานใน ME online ทั้งหมด (ราย)	จำนวนผู้ป่วยไข่ออกผื่น ที่ไม่ใช่หัดหัดเยอรมัน (ราย)	อัตราการรายงานผู้ป่วยที่ ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน	ความ ครอบคลุม วัคซีน MMR1*	ความ ครอบคลุม วัคซีน MMR2*
เมืองสุรินทร์	254,708	5	98	4	4	1.57	96.69	97.6
ชุมพลบุรี	69,716	2	0	0	0	0.00	98.63	97.74
ท่าตูม	93,609	2	0	0	0	0.00	96.62	96.8
จอมพระ	57,565	2	0	0	0	0.00	97.58	96.48
ปราสาท	150,974	3	0	0	0	0.00	95.88	92.07
กาบเชิง	59,546	2	0	0	0	0.00	97.66	92.31
รัตนบุรี	90,779	2	0	0	0	0.00	99.56	97.54
สนม	42,495	1	0	0	0	0.00	95.33	97.47
ศีขรภูมิ	132,622	3	0	0	0	0.00	97.57	94.07
สังขะ	129,646	3	2	0	0	0.00	95.32	93.9
ลำดวน	30,762	1	0	0	0	0.00	96.77	98.9
สำโรงทาบ	51,785	2	3	0	0	0.00	93.94	99.44
บัวเชด	41,326	1	0	0	0	0.00	99.34	95.88
พนมดงรัก	37,475	1	0	0	0	0.00	96.77	97.54
เขวาสินรินทร์	33,493	1	0	0	0	0.00	99.09	99.17
ศรีณรงค์	46,235	1	0	1	1	2.16	97.02	95.48
โนนนารายณ์	34,364	1	0	0	0	0.00	100	98.56
จ.สุรินทร์	1,357,100			5	5	0.37	96.93	95.71

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ปี 2568

ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคที่ต้องกำจัดการทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ความครอบคลุมและความทันเวลาการส่งรายงาน Zero report รายโรงพยาบาล

ปี พ.ศ.2569 จำนวน 28 สัปดาห์

ลำดับ	โรงพยาบาล	จำนวนสัปดาห์ที่รายงาน Zero Report		ร้อยละความครบถ้วนรายงาน Zero Report		ร้อยละทันเวลารายงาน Zero Report	
		AFP	Measle/Rubella	AFP	Measle/Rubella	AFP	Measle/Rubella
1	รพ.สุรินทร์	28	28	100	100	96.4	96.4
2	รพ.ชุมพลบุรี	28	28	100	100	92.9	92.9
3	รพ.ท่าตูม	28	28	100	100	100.0	100.0
4	รพ.จอมพระ	28	28	100	100	100.0	100.0
5	รพ.ปราสาท	28	28	100	100	96.4	100.0
6	รพ.กาบเชิง	28	28	100	100	100.0	100.0
7	รพ.รัตนบุรี	28	28	100	100	100.0	100.0
8	รพ.สนม	28	28	100	100	100.0	96.4
9	รพ.ศีขรภูมิ	28	28	100	100	64.3	60.7
10	รพ.สังขะ	28	28	100	100	100.0	100.0
11	รพ.ลำดวน	28	28	100	100	100.0	100.0
12	รพ.ลำโรงท่าบ	28	28	100	100	92.9	92.9
13	รพ.บัวเชด	28	28	100	100	96.4	96.4
14	รพ.ก.พนมดงรัก	28	28	100	100	92.9	92.9
15	รพ.เขวาสินรินทร์	28	28	100	100	100.0	100.0
16	รพ.ศรีณรงค์	28	28	100	100	85.7	89.3
17	รพ.โนนนารายณ์	28	28	100	100	96.4	92.9
18	รพ.รวมแพทย์หมอนันต์	28	28	100	100	71.4	71.4
19	รพ.สุรินทร์รวมแพทย์	28	28	100	100	100.0	100.0
20	รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน	28	28	100	100	89.3	89.3

ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคที่ต้องกำจัดการทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

การดำเนินงานเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP)

โรคหัดและหัดเยอรมัน (Measles and Rubella)

ขอความร่วมมือค้นหาผู้ป่วย

1. โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ ค้นหาผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หากพบผู้ป่วยให้ดำเนินการแจ้งไปยังงานระบาดวิทยาของโรงพยาบาลดำเนินการสอบสวนโรคภายใน 48 ชั่วโมง และเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ตัวอย่าง
2. โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ ค้นหาผู้ป่วยไข่ออกผื่น ที่เข้าได้ตามนิยามเฝ้าระวังหัด หัดเยอรมัน (มีไข้ ร่วมกับผื่นนูนแดง) หากพบผู้ป่วยดำเนินการแจ้งไปยังงานระบาดวิทยาของโรงพยาบาล เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคผู้ป่วยสงสัย และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหา IgM Measle และ IgM Rubella
3. โรงพยาบาลทุกแห่ง รายงานผู้ป่วยเท่ากับศูนย์ หากไม่พบผู้ป่วยสงสัย AFP และผู้ป่วยไข่ออกผื่น โดยรายงานในลิงค์ Zero Report สคร.9 ภายในวันจันทร์ถัดไปของทุกสัปดาห์ ตามมติที่ประชุมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

งาน HBV HCV OV-CCA

แนวทางการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569



ใช้การตรวจด้วยอุจจาระตามแนวทางการคัดกรองของกรมควบคุมโรค

1 กลุ่มเป้าหมาย



อำเภอเสี่ยงสูง อ.รัตนบุรี อ.ท่าตูม อ.ชุมพลบุรี อ.จอมพระ
อ.บ้านเจด อ.สำโรงทาบ ปี 2568 พบพยาธิใบไม้ตับ 3)

ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

เช่น กินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวสุกๆ ดิบๆ




ก้อยปลา

2 ขั้นตอนการคัดกรอง

ลงทะเบียน

ประเมินความเสี่ยง

เก็บตัวอย่างอุจจาระ



3 วิธีการตรวจและวินิจฉัย



วิธี Modified Kato-Katz

ค้นหาไข่พยาธิใบไม้ตับ

ผลตรวจเป็นบวก (Positive)

ผลตรวจเป็นลบ (Negative)

ไข่พยาธิใบไม้ตับ



4 การบริหารจัดการและส่งต่อ



หากไม่พบไข่พยาธิ

หากพบไข่พยาธิ

แนะนำให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

และนัดตรวจซ้ำรายปี



จ่ายยาถ่ายพยาธิ (Praziquantel)

ให้ความรู้เรื่องพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี



ตรวจอัลตราซาวด์
(เฝ้าระวังมะเร็งท่อน้ำดี)
ในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป

อาหารสุก



สุขภาพดี

ตามแนวทางการคัดกรองกรมควบคุมโรค



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE


ผลการดำเนินงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี รายอำเภอจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : ในปี 2569 ประชากรที่เกิดก่อนปี 2535 และกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จำนวน 100,000 คน

ผลการคัดกรอง

- HBV = 83,052 ราย (83.05%)
Positive = 1,261 (1.52%)
- HCV = 89,984 ราย (89.48%)
Positive = 268 (0.30%)

ร้อยละ



แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได้รับการรักษาร้อยละ 60 , ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ได้รับการรักษาร้อยละ 80

❖ **HBV Positive** จำนวน 1,261 ราย (1.52%) ผล **confirm HBV Positive** = 1,143 ราย
ได้รับการรักษา 907 ราย (79.35%)

❖ ผลการรักษา HCV Positive = 268 (0.30%)
ได้รับการส่ง VL 215 ราย 96.85 (รพผล 46 ราย,
ผลลบ 13 ราย) จำนวนผู้ที่มีผลการตรวจยืนยันเป็นบวก
156 ราย (70.27%) จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
ได้รับการรักษา 140 ราย (89.74%)



แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (OV) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : คัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระ จำนวน 5,500 คน

ผลงาน

- OV = 5,758 ราย (104.69%)
พบ OV = 46 ราย (0.80%)



แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรอง OVCCA จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี (CCA) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ จำนวน 2,000 คน

ผลงาน

ร้อยละ



- CCA = 2,487 ราย (124.40%)
ผลผิดปกติ 777 ราย (31.23%)
สงสัย CCA 3 ราย (0.12%)

แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรอง OVCCA จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ และ โรคติดต่ออันตราย



Avian Influenza

โรคไข้หวัดนก



สถานการณ์ไข้หวัดนก ประเทศกัมพูชา

จำนวนผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก H5N1 ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ ปี 2566 - 2569



ปี 2569 พบผู้ป่วย จำนวน 5 ราย ชาย 2 ราย หญิง 3 ราย

- รายที่ 4 รายงาน 22 เม.ย.69 เพศหญิง อายุ 66 ปี จ. สวายเรียม (เสียชีวิต)
- รายที่ 5 รายงาน 11 ก.ค.69 เพศหญิง อายุ 9 เดือน กรุงเทพมหานคร (กำลังรักษา)
- ปัจจัยเสี่ยง สัมผัส สัตว์ปีกที่ป่วยและตาย บริเวณบ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค.69)



สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

- สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้าน พบรายงานจากประเทศกัมพูชาต่อเนื่อง ปี 66-69 (รวม 39 ราย เสียชีวิต 16 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 41.03)
- สายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา จัดอยู่ในกลุ่ม Clade 2.3.2.1e เป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูง พบในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม และลาว ส่วนสายพันธุ์ที่ระบาดในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และหลายพื้นที่ทั่วโลก เป็น Clade 2.3.4.4b มีความรุนแรงน้อยกว่า
- ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรก เมื่อ ก.ค. 47 และผู้ป่วยรายสุดท้าย ในปี 49 โดยมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก จำนวน 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดนก
- ความเสี่ยง ด้านการอพยพหนีภัยสงคราม อาจเปิดทางให้เชื้อแพร่ข้ามมายังฝั่งไทยได้ง่ายขึ้น
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ งดเคลื่อนย้าย ห้ามนำมารับประทาน และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และเก็บซากสัตว์ปีกส่งตรวจหาสาเหตุการตาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์ป่วยสู่คนได้ทันเวลาที่



Ebola virus disease - EVD

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา



โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)

สถานการณ์ในต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สายพันธุ์บันดึบูเกียว ดังนี้

- สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2569 ผู้ป่วยสงสัย 284 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 1,830 ราย เสียชีวิต 648 ราย (CFR คิดเป็นร้อยละ 35 ในกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน) รักษาหาย 330 ราย
- สาธารณรัฐยูกันดา ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค.2569 มีผู้ป่วยยืนยัน 20 ราย เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้เสียชีวิตที่เข้าข่าย (Probable death) 1 ราย (CFR คิดเป็นร้อยละ 10) รักษาหาย 17 ราย
- สาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค.2569 ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย รักษาหาย 1 ราย

ที่มา : องค์การอนามัยโลก Alert and Response

สถานการณ์ในประเทศไทย

ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในประเทศไทย มาตรการยังคงเดิม ยังไม่มีการลดระดับ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์ผู้ป่วย Covid-19 ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่ จำนวน 28,904 ราย (43.965 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน)

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายใหม่ จำนวน 5 ราย (0.008 อัตราตายต่อประชากรแสนคน)



กระทรวงสาธารณสุข

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์โรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง
Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 18 ก.ค. 2569

ประเภท

ผู้ป่วยใน (IPD)

ผู้ป่วยนอก (OPD)

รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น

ผู้ป่วย (คน)

รายใหม่
สัปดาห์นี้
(12 – 18 ก.ค. 69)

สะสม
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 69)

อัตรา/แสนประชากร
(สะสม)

เสียชีวิต (คน)

รายใหม่
สัปดาห์นี้
(12 – 18 ก.ค. 69)

สะสม
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 69)

อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (DDS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น.

อำเภอ

เมืองสุรินทร์

ชุมพลบุรี

ท่าตูม

จอมพระ

ปราสาท

กาบเชิง

รัตนบุรี

สนม

ศีขรภูมิ

สังขะ

ลำดวน

สำโรงทาบ

บัวเชด

พนมดงรัก

ศรีณรงค์

เขวาสินรินทร์

โนนนารายณ์

ผู้ป่วยใน (IPD)

ผู้ป่วยนอก (OPD)

เสียชีวิต

รายใหม่

สะสม

อัตรา/
แสนประชากร
(สะสม)

รายใหม่

สะสม

อัตรา/
แสนประชากร
(สะสม)

รายใหม่

สะสม

อัตราป่วยตาย
(ร้อยละ)

จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามช่วงอายุ

0-4

5-9

10-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60 up

OPD

IPD



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. สถานการณ์ผู้ป่วยจังหวัดสุรินทร์ พบว่ามีการรายงานผู้ป่วย ใน สัปดาห์ที่ 29 (12 – 18 กรกฎาคม 2569) มีจำนวน 15 ราย มีแนวโน้มคงตัวในระดับต่ำ
2. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 69 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต (Died from Covid-19)
3. มาตรการการป้องกันโรคเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ผู้ที่ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น, ล้างมือบ่อย ๆ, ไม่ใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
4. การเฝ้าระวังสถานการณ์ในโรงเรียน ชุมชน ค่ายทหาร และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ร่วมกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

โรคไข้หวัดใหญ่



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์ที่ 29 (12 – 18 กรกฎาคม 69)

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยพบผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ 235,539 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 357.61 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 22 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.01
- สสจ.สุรินทร์ ได้รับรายงาน ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 3,344 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 246.41 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
- อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1 : 1.18
- จังหวัดสุรินทร์ อันดับที่ 2 ของเขต และอันดับที่ 43 ของประเทศ

อำเภอ	จำนวนผู้ป่วยสะสม	อัตราป่วยต่อแสนประชากร
เขวาสินรินทร์	129	385.16
โนนนารายณ์	65	189.15
ท่าตูม	121	129.26
พนมดงรัก	257	685.79
จอมพระ	91	158.08
บัวเชด	103	249.24
เมืองสุรินทร์	567	222.61
ศีขรภูมิ	301	226.96
ศรีณรงค์	220	475.83
ลำดวน	139	451.86
สำโรงทาบ	109	210.49
กาบเชิง	155	260.3
ปราสาท	187	123.86
ชุมพลบุรี	101	144.87
รัตนบุรี	164	180.66
สังขะ	550	424.23
สนม	85	200.02
จังหวัดสุรินทร์	3344	246.41




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์ที่ 29 (12 – 18 กรกฎาคม 69)


- กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
 - 5-9 ปี (61.75 ต่อแสน ปชก.)
 - 10-14 ปี (46.13 ต่อแสน ปชก.)
 - 0-4 ปี (38.54 ต่อแสน ปชก.)

อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกตามกลุ่มอายุ จ. สุรินทร์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2569



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายเดือน จังหวัดสุรินทร์
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2569 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

◆ ปี 2568 ● มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ▲ ปี 2569





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ โรคไข้หวัดใหญ่

1. สถานการณ์ผู้ป่วยจังหวัดสุรินทร์ พบว่าผู้ป่วยใน สัปดาห์ที่ 29 (12 – 18 กรกฎาคม 69) มีแนวโน้มลดลง ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
2. เน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี
3. มาตรการการป้องกันโรคเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ผู้ที่ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น, ล้างมือบ่อย ๆ, ไม่ใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
4. การเฝ้าระวังสถานการณ์ในโรงเรียน ชุมชน ค่ายทหาร และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ร่วมกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ